

Infeciologia | Caso Clínico

PD-250 - (21SPP-11343) - TUBERCULOSE PULMONAR - DESAFIO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Manuel Lima Ferreira¹; Mafalda Moreira¹; Carolina Fraga²; Carla Brandão¹; Cláudia Monteiro¹; Lucília Vieira¹

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa; 2 - Serviço de Pediatria, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto

Introdução / Descrição do Caso

A Tuberculose Pulmonar (TP) representa ainda um problema de Saúde Pública. Na adolescência, a clínica é semelhante à da idade adulta e inclui sintomas respiratórios e constitucionais como astenia, perda ponderal e hipersudorese noturna. Com a emergência de sequelas de infeção por SARS-CoV-2, verifica-se a possível sobreposição de sintomas entre ambas.

Adolescente de 13 anos, sexo feminino, com antecedentes de infeção sintomática por SARS-CoV-2 5 meses antes e manutenção subsequente de tosse produtiva e toracalgia ocasional. Observada em mais que uma ocasião pelo médico assistente, com realização de estudo analítico, radiografia torácica e referenciação a Pneumologia Pediátrica por suspeita de sequelas pós-COVID-19. Trazida ao Serviço de Urgência por astenia e dispneia para médios esforços, associada a febre. Apresentava perda ponderal de 10 kg no último ano e à auscultação pulmonar crepitações dispersas e sopro tubar à esquerda. Analiticamente com Hb 11.0 g/dL, VS 61 mm, PCR 89.5 mg/L e radiografia torácica a evidenciar infiltrado intersticial bilateral e imagem sugestiva de cavitação à esquerda. Decidido internamento para antibioterapia e rastreio de TP. Diagnóstico confirmado pelo exame direto da expectoração, com posterior início de tuberculostáticos. Cerca de 1 semana após a alta regressa por vómitos, constatando-se uma elevação dos parâmetros hepáticos, interpretada como iatrogenia farmacológica.

Comentários / Conclusões

Destaca-se a importância da valorização de sintomas respiratórios e constitucionais na possibilidade de diagnóstico de TP. Neste caso, o período pós-infeção por SARS-CoV-2 funcionou como fator confundidor à abordagem atempada de uma doença com uma morbilidade e contagiosidade importantes, e um tratamento por vezes desafiante.

Palavras-chave : Tuberculose Pulmonar, SARS-CoV-2, Sintomas constitucionais