

PAS-022 - (21SPP-11344) - HIPERUTILIZADORES DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 – O QUE MUDOU?

Marta Oliveira Martins¹; Mariana Domingues^{1,2}; Fernanda Rodrigues^{1,2}

1 - Serviço de Urgência e Unidade de Infeciologia, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Clínica Universitária de Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra

Introdução e Objectivos

Durante a pandemia COVID-19 verificou-se uma redução significativa do recurso aos Serviços de Urgência (SU) pediátricos. O seu impacto nos hiperutilizadores (HU) não está caracterizado. Descrever os HU durante o primeiro ano de pandemia e comparar com o período pré-pandemia.

Metodologia

Estudo descritivo retrospectivo dos episódios de urgência de um hospital pediátrico terciário de março/2020 a fevereiro/2021 (período pandémico) e comparação com os HU identificados em 2018 (período pré-pandémico). Definiram-se como HU os doentes com ≥ 10 episódios.

Resultados

A comparação das principais características dos HU nos dois períodos é apresentada na tabela. Observou-se uma redução importante dos HU (0,6% para 0,06%). A mediana de episódios por HU e a mediana de idade foram semelhantes. A maioria continuou a recorrer por iniciativa dos cuidadores e teve alta sem referência, com aumento dos episódios relacionados com as observações prévias. Na pandemia os HU recorreram menos ao SU nos confinamentos e não no verão, como em 2018. Apesar da redução muito importante dos episódios, os diagnósticos infecciosos e respiratórios mantiveram-se como os mais frequentes, destacando-se, no entanto, o desaparecimento da bronquiolite aguda e da asma. Destaca-se também o surgimento da patologia neuro-psiquiátrica nos principais diagnósticos. Apenas 1 dos HU de 2018 se manteve em 2020/21.

Conclusões

A pandemia levou à redução dos HU, em particular nos períodos de confinamento, e alteração do seu perfil. A maioria das observações manteve-se por patologia infecciosa e respiratória, apesar do desaparecimento da bronquiolite e redução da asma. Verificou-se ainda um aumento de queixas psiquiátricas e maior recorrência no mesmo episódio de doença.

Palavras-chave : Hiperutilizadores; Urgência Pediátrica; COVID-19