Urgência | Caso Clínico

PD-280 - (21SPP-11379) - DOR TORÁCICA, PNEUMONIA OU OUTRA...

Joana Pereira-Nunes¹; Tatiana Moreira¹; Margarida Vicente-Ferreira¹; Vítor Costa²; Ana Maia¹

1 - Serviço de Pediatria, Unidade Autónoma de Gestão da Mulher e Criança, Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Serviço de Pediatria, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

Introdução / Descrição do Caso

A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é usual em pediatria. Sendo um diagnóstico clínico, a realização de radiografia torácica (RT) para confirmação imagiológica é frequente. A aparente normalidade radiográfica não permite a sua exclusão, nomeadamente em pacientes imunodeprimidos.

Criança de 7 anos, trazida ao SU por dificuldade respiratória e dorsalgia direita com início e agravamento ao longo do dia. Apresentava tosse escassa com evolução arrastada e posição antálgica. Sem febre ou outros sintomas. Sem contactos com SARS-CoV2.

Estava queixosa, taquipneica, com dor à percussão da região dorsal direita e sons respiratórios diminuídos no 1/3 inferior. RT sem alterações; o estudo analítico revelou bicitopenia (Hgb 5.1 g/dL, plaquetas 19 000/uL) e leucocitose com presença de blastos (GB 24 850/uL, 81.9% leucoblastos). Por suspeita de doença linfoproliferativa foi transferida para o IPO no mesmo dia.

Na admissão, a RT foi repetida e diagnosticada PAC e medicada com piperacilina/tazobactam. Agravamento do SDR e hipoxemia progressivamente ao longo de 24h, com derrame pleural de grande volume. Associada vancomicina e realizada toracocentese. O diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda foi estabelecido e a quimioterapia iniciada 48h após a admissão. Novo agravamento 72h depois, com necessidades crescentes de FiO₂, realizando TC torácica com franca loculação. Necessidade de VMI durante 24h e descorticação pleural toracoscópica.

Comentários / Conclusões

O presente caso pretende lembrar a importância basilar da clínica para o diagnóstico de PAC. A fiabilidade na aparente normalidade da radiografia inicial presente numa paciente com doença linfoproliferativa desconhecida, poderia ter contribuído para o possível atraso de ambos os diagnósticos.

Palavras-chave : Dor torácica, Pneumonia, Leucemia, Doença Linfoproliferativa