

Cirurgia Pediátrica | Caso Clínico

EP-017 - (21SPP-11444) - UMA CAUSA POUCO FREQUENTE DE DOR ABDOMINAL EM ADOLESCENTE

Patrícia Silva¹; Sofia Guedes¹; Filipa Sutre¹; Sónia Marques¹; Liza Aguiar¹; Aldina Lopes¹

1 - Hospital de Santarém

Introdução / Descrição do Caso

A dor abdominal é um dos sintomas que mais motiva a procura do Serviço de Urgência Pediátrica (SUP). Apesar de comum, é um sintoma inespecífico, podendo traduzir-se em patologia invulgar.

Adolescente de 17 anos do sexo masculino, com seguimento em consultas de Pedopsiquiatria e Pediatria do Desenvolvimento por Perturbação da hiperatividade e défice de atenção e alterações do comportamento, medicado com risperidona, recorreu ao SUP por dor abdominal intensa, obstipação, náuseas e vómitos, com seis dias de evolução. À observação, com abdómen muito distendido, dor à palpação e defesa.

Analicamente com discreto aumento dos parâmetros inflamatórios. A ecografia abdominal revelou ansas intestinais dilatadas com conteúdo líquido, sugerindo a realização de tomografia computadorizada (TC). Na TC abdominal visualizou-se a presença de conteúdo heterogéneo em ansa de delgado ao nível da abertura pélvica superior, com significativa distensão de ansas a montante, compatível com quadro de oclusão, por provável presença de corpo estranho.

Foi submetido a cirurgia com remoção do corpo estranho. O relatório anatomopatológico demonstrou a existência de um nódulo, constituído por detritos celulares parcialmente calcificados e agregados de microrganismos envolvidos em material mucofibrilar, compatível com bezoar. Pós-operatório sem intercorrências.

Comentários / Conclusões

Os bezoares são causas raras de oclusão intestinal em idade pediátrica. Definem-se como um corpo estranho resultantes da acumulação de material ingerido mas não digerido, com localização comum no tubo digestivo. Alguns tipos de bezoar podem ser removidos por fragmentação endoscópica. Bezoares grandes, como o caso clínico descrito, que causam oclusão intestinal, impõem remoção cirúrgica.

Palavras-chave : dor abdominal, oclusão intestinal, bezoar