

Cirurgia Pediátrica | Caso Clínico

EP-025 - (21SPP-11536) - HÉRNIA INGUINAL BILATERAL EM MENINA - SERÃO MESMO OVÁRIOS?

Ana Luísa De Carvalho¹; Daniela Araújo¹; Angélica Osório²; Ana Antunes¹; Maria Miguel Gomes^{1,3}

1 - Serviço de Pediatria do Hospital de Braga; 2 - Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Braga; 3 - Escola de Medicina da Universidade do Minho

Introdução / Descrição do Caso

Introdução: As hérnias inguinais(HI) são comuns na pediatria. Ocorrem em 1-5% dos recém-nascidos e são mais frequentes no sexo masculino e prematuros. As hérnias inguinais bilaterais(HIB) são raras no sexo feminino e o estudo deve ser célere, pelo risco de serem secundárias a patologia endócrina, como síndrome de insensibilidade aos androgénios. Têm risco de encarceramento e torção de até20%.

Descrição do caso: Lactente de 6meses fenotipicamente feminina, enviada à consulta de Cirurgia Pediátrica por HIB. Gestação de termo, com diabetes gestacional controlada com dieta e hipotireoidismo controlado com levotiroxina. Ecografias pré-natais normais e serologias sem infeção ativa. Parto eutócico e somatometria adequada à idade gestacional. Diagnóstico precoce normal. Evolução estatura-ponderal e DPM adequados. Ao exame apresentava tumefação inguinal bilateral oval, de consistência elástica, bem definida, irreductível e sem sinais inflamatórios. Após discussão com endocrinologia pediátrica realizou estudo endocrinológico: FSH 5,19mIU/mL, LH indoseável, estradiol 61,34ng/dL, 17-OHP normal, testosterona indoseável e cariótipo 46XX. A ecografia mostrou ovários encarcerados bilateralmente, pelo que foi corrigida laparoscopicamente, sem intercorrências. Dois meses depois, está assintomática.

Comentários / Conclusões

Conclusão: No sexo feminino, as HI devem-se à persistência do canal de Nuck e podem conter, mais frequentemente, ansas intestinais. A herniação de ovários e/ou trompas de Falópio é menos frequente, sendo as HIB com encarceramento de ovário bilateralmente extremamente raras. Uma tumefação bilateral destas características obriga a exclusão de testículos criptorquídicos, apesar de fenótipo feminino, e os pais deverão ser alertados para essa possibilidade.

Palavras-chave : Hérnia inguinal bilateral; ovários encarcerados.