Infecciologia | Caso Clínico

EP-090 - (21SPP-11669) - DERMATITE ATÓPICA - UM DIAGNÓSTICO COMUM A PROPÓSITO DE UMA COMPLICAÇÃO RARA

Mariana Pedro[1]; Marta Caldas[1]; Ana Catarino Gomes[2]; Fernanda Neves[3]; Sara Diogo[1]; Fabiana Fortunato[1]

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Oeste, Unidade Caldas da Rainha; 2 - USF Arandis, ACES Oeste Sul, ARS Lisboa e Vale Tejo; 3 - Serviço de Dermatologia, Centro Hospitalar do Oeste, Unidade Caldas da Rainha

Introdução / Descrição do Caso

A dermatite atópica (DA) é uma doença cutânea crónica, pruriginosa e inflamatória que afeta 5 em cada 20 crianças mundialmente. Estas apresentam uma predisposição a desenvolverem lesões cutâneas bacterianas ou virais.

Lactente de 4 meses, do sexo masculino, com antecedentes pessoais de DA. Aparentemente bem até 3 semanas antes da admissão, altura em que surgiram lesões descamativas amareladas no couro cabeludo, admitindo o diagnóstico de crosta láctea. Por agravamento das lesões cutâneas com presença de exsudado iniciou amoxicilina e ácido clavulânico, sendo referenciado a consulta de dermatologia. Posteriormente por disseminação das lesões para a face e membros foi referenciado para o Serviço de Urgência Pediátrico (SUP). Apresentava familiar com infeção labial herpética com lesões ativas. Ao exame objetivo, à admissão no SUP, apresentava bom estado geral e lesões vesiculo-papulares exsudativas na face, couro cabeludo, tronco, membros, nádegas e períneo. Efetuou avaliação analítica, incluindo serologia para VIH, doseamento de imunoglobulinas e populações linfocitárias; apenas a referir eosinofilia grave e IgE total ligeiramente aumentada. Admitido o diagnóstico de eczema herpético com provável sobreinfeção, pelo que iniciou aciclovir e flucloxacilina. Manteve seguimento em consulta de pediatria e dermatologia, com resolução das lesões após 2 meses.

Comentários / Conclusões

O eczema herpético caracteriza-se pela sobreinfeção vírica de uma dermatose inflamatória preexistente, mais frequente na DA, que pode demorar até 6 semanas a cicatrizar. Causada pelos vírus Herpes simplex (VHS) tipo 1 e 2, sendo considerada uma emergência dermatológica rara que afeta < 3% das crianças com DA.

Palavras-chave : Dermatite atópica, Herpes simplex, Pediatria