Cirurgia Pediátrica | Caso Clínico

EP-027 - (21SPP-11670) - INVAGINAÇÃO INTESTINAL NA ADOLESCÊNCIA - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

André Costa Azevedo¹; André Costa E Silva¹; Inês Rua^{1,3}; Cátia Juliana Silva¹; Inês Correia Magalhães¹; Isabel Martinho¹; Angélica Osório²; Sandrina Martins¹

1 - Serviço de Pediatria, Unidade Local de Saúde do Alto Minho; 2 - Serviço de Cirurgia Pediátrica, Hospital de Braga; 3 - Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC

Introdução / Descrição do Caso

A invaginação intestinal é a causa mais comum de obstrução intestinal nos dois primeiros anos de vida, sendo frequentemente idiopática e não obrigando a pesquisa de *leading point* patológico. Na adolescência é rara e deve ser investigada uma patologia subjacente. Adolescente de 16 anos de idade, sexo feminino, caucasiana. Recorreu ao serviço de urgência por dor abdominal generalizada tipo cólica, associada a vômitos com 12h de evolução, inicialmente alimentares e posteriormente biliares, e a sangue nas fezes. Ao exame objetivo, apresentava mucosas desidratadas e dor à palpação dos quadrantes inferiores do abdómen, sem sinais de irritação peritoneal. O estudo analítico revelou leucocitose, sem alterações na função renal, ionograma, aminotransferases, bilirrubina total, amilase e proteína C reativa. A ecografia abdominal evidenciou imagem sugestiva de invaginação ileocólica com cerca de 6 centímetros, confirmada por tomografia computadorizada. Tratava-se de um 3º episódio de invaginação intestinal, os anteriores aos 11 e 14 anos de idade, ambos com resolução espontânea. Transferiu-se para cirurgia pediátrica e perante quadro oclusivo com imagem sugestiva de invaginação ileocólica em adolescente com hematoquézia e episódios prévios semelhantes, foi mandatário realizar laparoscopia exploradora. Intraoperatoriamente confirmou-se a suspeita de divertículo de Meckel e realizou-se enterectomia.

Comentários / Conclusões

Embora maioritariamente idiopática, a incidência de patologia subjacente à invaginação intestinal aumenta com a idade, sendo identificada em 2-8% do casos, incluindo divertículo de Meckel, pólipos, neoplasias, parasitoses, entre outras. Este caso clínico demonstra a importância de investigar os casos de invaginação com apresentação em idade atípica.

Palavras-chave : adolescente, invaginação intestinal, hemorragia digestiva baixa