Infeciologia | Caso Clínico

EP-075 - (21SPP-11687) - TUMEFAÇÃO CERVICAL NUM LACTENTE: SERÁ TUBERCULOSE?

Joana Brígida Capela¹; Inês Almeida¹; Mariana Reis¹; Filipa Dias¹; Maria João Virtuoso¹

1 - Serviço de Pediatria – Centro Hospitalar e Universitário do Algarve – Unidade de Faro

Introdução / Descrição do Caso

A tuberculose ganglionar cervical é a apresentação mais comum de tuberculose extrapulmonar na infância. É rara em países desenvolvidos e pode resultar de disseminação hematogénea ou infecção do anel de Waldeyer. A ulceração, fistulização e abscesso surgem como complicação. O diagnóstico é feito por ecografia e biópsia (anatomopatologia, exame micobacteriológico e teste de amplificação de ácidos nucleicos - TAAN). O tratamento com tuberculostáticos de primeira linha é eficaz, com bom prognóstico.

Trata-se de um lactente de 4 meses, não vacinado com BCG, apesar de pertencer a grupo elegível. Recorreu ao serviço de urgência por tumefação abaixo do ângulo da mandíbula esquerdo com 10 dias de evolução, dolorosa, com sinais inflamatórios. Na admissão apresentava-se febril, sem outras adenopatias palpáveis. Analiticamente com anemia (108g/L), leucocitose (37300/uL) e PCR 19mg/L. A ecografia de partes moles revelou múltiplas adenomegalias sem trajeto fistuloso. Iniciou antibioterapia empírica por diagnóstico provável de adenite bacteriana, sem melhoria. Foi drenado com saída de exsudado purulento, com exame bacteriológico negativo. Durante o internamento a mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar bacilífera. Realizou prova de Mantoux, IGRA e pesquisa de TAAN no pus, que foram positivos. A biópsia ganglionar excisional revelou granulomas necrotizados. Sem evidência de foco pulmonar primário ou doença pulmonar ativa. Iniciou tuberculostáticos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) com evolução clínica favorável até à data.

Comentários / Conclusões

O caso descrito alerta para a importância da suspeição deste diagnóstico, perante contexto epidemiológico e clínica sugestivos, apesar de ser uma entidade pouco comum na faixa etária apresentada.

Palavras-chave : tuberculose ganglionar, adenopatia cervical