

Neonatologia | Caso Clínico

PD-009 - (21SPP-11809) - ICTERÍCIA NEONATAL-ROTINA OU DESAFIO DIAGNÓSTICO?

Beatriz De Sousa¹; Catarina Pinto Silva²; Rita Lages Pereira³; Liane Moreira¹; Bernarda Sampaio¹; Joana Neves¹

1 - Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães; 2 - Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 - Hospital de Braga

Introdução / Descrição do Caso

Introdução:

A icterícia neonatal é uma condição comum e frequentemente benigna, embora uma das principais causas de hospitalização na 1ª semana de vida.

O desafio diagnóstico passa por diferenciar recém nascidos (RN) com icterícia fisiológica daqueles com condições raras ameaçadoras de vida, evitando simultaneamente exames desnecessários.

Descrição de caso:

RN termo precoce, fruto de gestação vigiada, mãe ARh+ com serologias maternas normais que realizou vacinação anti-SARS-CoV2 na gestação. Nasce por parto eutócico, IAPgar 10/10, somatometria adequada e sem risco infeccioso. Em D3 de vida notada icterícia com critérios para fototerapia. Em D4 de vida por apresentar palidez cutânea realiza estudo analítico que revela hiperbilirrubinemia indireta e anemia normocítica normocrômica com reticulocitose, ferropenia e o esfregaço de sangue com esquizócitos e ovalócitos. Prossegue-se estudo etiológico, sem alterações, à exceção de hemorragia suprarrenal bilateral detetada na ecografia abdominal, sem coagulopatia associada. Durante o internamento, manteve vigilância ecográfica com redução progressiva das dimensões da hemorragia, sem sinais clínicos e analíticos de insuficiência suprarrenal (IS).

Comentários / Conclusões

Discussão:

A hemorragia neonatal da suprarrenal é uma condição relativamente incomum (0.2-0.55% das patologias neonatais). Os principais fatores de risco são a hipoxia, trabalho de parto prolongado, macrossomia, infeção intrauterina e coagulopatia. A apresentação clínica é variável: assintomáticos, com icterícia, massa abdominal, anemia até hemorragia fulminante com risco de IS.

Com este caso clínico pretende-se alertar para que, mesmo sem fatores de risco, pode ocorrer hemorragia suprarrenal.

Palavras-chave : icterícia, neonatal, hemorragia suprarrenal