

## **Gastrenterologia, Nutrição e Hepatologia | Caso Clínico**

### **EP-107 - (1JDP-10022) - SINDROME DOS VÔMITOS CÍCLICOS: CASO CLÍNICO**

André Costa E Silva<sup>1</sup>; André Azevedo<sup>1</sup>; Sofia Poço Miranda<sup>1</sup>; Carolina Germana<sup>1</sup>; Vera Gonçalves<sup>1</sup>; Sandrina Martins<sup>1</sup>

1 - Unidade Local de Saúde do Alto Minho

#### **Introdução / Descrição do Caso**

Os vômitos são dos sintomas mais frequentes na infância e um motivo muito comum de consulta. N sua base podem estar etiologias variadas. Os autores pretendem relembrar uma entidade que representa um diagnóstico de exclusão de vômitos recorrentes.

Adolescente de 10 anos, sexo masculino, sem antecedentes de relevo, orientada para consulta de pediatria por episódios de vômitos recorrentes desde os 6 anos de idade. Referia cerca de 6 episódios por ano, de instalação súbita, com 5 a 10 vômitos por episódio associados a cefaleia frontoparietal, dor abdominal, prostração e resolução do quadro em 24 a 48 horas. Entre episódios encontrava-se assintomático. Negava associação com alimentos, infecções ou jejum. Sem alteração do trânsito intestinal ou repercussão ponderal. Sem antecedentes familiares de relevo. Ao exame objetivo sem alterações. Foi realizado hemograma, gasimetria venosa, perfil hepático, amilase, lipase, amónia, urina, radiografia tórax, ecografia abdominal e trânsito esofagogastroduodenal. Na ausência de alterações nos exames auxiliares de diagnóstico, e por cumprir os critérios clínicos de síndrome dos vômitos cíclicos, foi medicado com amitriptilina com diminuição do número de crises.

#### **Comentários / Conclusões**

A síndrome dos vômitos cíclicos constitui um distúrbio gastrointestinal funcional. É caracterizado por episódios intensos e recorrentes de vômito que persistem por horas ou dias com intervalos assintomáticos entre eles. De etiopatogenia ainda mal conhecida, apresenta uma prevalência de 0.7% a 2% na população pediátrica e idade de início cerca dos 6 anos. Apresenta um diagnóstico diferencial vasto e constitui um diagnóstico de exclusão. A amitriptilina está estabelecida enquanto terapêutica profilática acima dos 5 anos.

**Palavras-chave : Síndrome vômitos cíclicos**