

EP-129 - (1JDP-10030) - BÓCIO COMO APRESENTAÇÃO RARA DE LINFOMA DE HODGKIN

Francisca Manoel¹; Leonor Aires Figueiredo¹; Gabriela Botelho¹; Nádia Santos¹; Patrícia Romão¹; Cristina Mendes²

1 - Serviço de Pediatria, Departamento da Saúde da Mulher e Criança, Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE; 2 - Serviço de Pediatria, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE

Introdução / Descrição do Caso

Linfoma de Hodgkin (LH) é um dos linfomas comuns na adolescência. Contudo, a apresentação inicial em locais extra-nodais é incomum, sendo raro o envolvimento da tiróide. Rapaz de 14 anos, obeso (IMC P99), trazido ao serviço de urgência por tumefacção cervical com uma semana de evolução, tosse e dispneia em decúbito. Sem febre ou outros sintomas constitucionais. Apresentava bom estado geral, eupneico, bócio com tiróide difusamente aumentada à palpação, consistência dura, sem nódulos ou adenomegalias palpáveis. Analiticamente eutiroideu, anticorpos anti-tiroideus negativos, sem citopénias ou alterações dos parâmetros de lise celular. Ecografia mostrou aumento heterogéneo da tiróide, com nodularidades sólidas hipoecogénicas, a maior 50x45x32mm à esquerda, afilamento da traqueia e múltiplas adenopatias cervicais e supraclaviculares. O exame anatomo-patológico das lesões da tiróide e de gânglio supraclavicular confirmou LH clássico tipo esclerose nodular. Estadiamento (TC/PET) mostrou neoplasia metabolicamente ativa a nível tiroideu, ganglionar cervical baixo, supra-clavicular, mediastínico, pulmonar e possivelmente tímico (estadio IV). Iniciou quimioterapia (QT) dirigida. Avaliação após 2º ciclo de QT com remissão morfológica parcial na TC e PET pelo que prosseguiu QT com mais 4 ciclos seguida de radioterapia sobre as lesões iniciais.

Comentários / Conclusões

Os casos de LH com envolvimento da tiróide apresentam-se tipicamente com crescimento rápido de uma massa tiroideia. A ausência de sintomas constitucionais, adenomegalias palpáveis ou alterações hematológicas torna o caso peculiar, exigindo um elevado nível de suspeição. Apesar da apresentação incomum e dos poucos casos descritos na literatura o LH deve ser considerado como diagnóstico diferencial de bócio.

Palavras-chave : Linfoma de Hodgkyn, LH, Tiróide, Extra-nodal, Tumefacção cervical, Massa cervical, Bócio