

EP-176 - (1JDP-10032) - INFEÇÃO A MYCOPLASMA PNEUMONIAE – UMA MANIFESTAÇÃO MENOS COMUM

Andreia Romana¹; Ana Lança²; Frederico Bonito³; Henriqueta Cunha³; Manuela Braga¹; Margarida Pinto¹

1 - Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta EPE; 2 - Serviço de Pediatria, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE; 3 - Serviço de Dermatologia, Hospital Garcia de Orta EPE

Introdução / Descrição do Caso

A infeção por *Mycoplasma pneumoniae* é causa frequente de pneumonia em idade pediátrica e 25% dos doentes apresentam manifestações extrapulmonares. A excessiva resposta imunitária do hospedeiro cursa com a formação de complexos imunes responsáveis pelas manifestações dermatológicas, como a púrpura de Henoch-Schönlein, entre outras.

Criança de 12 anos sem antecedentes relevantes, recorre à urgência por lesões purpúricas com 10 dias de evolução associadas a artralgia dos tornozelos. Nega dor abdominal e febre. Nega ingestão de fármacos. Na observação, lesões maculopapulares purpúricas simétricas nos membros inferiores, sem mucosite, edema articular ou outras alterações; pressão arterial adequada à idade e sexo. Hemograma normal e proteína c-reativa negativa; exame sumário de urina sem proteinúria ou hematúria. Colocada a hipótese diagnóstica de púrpura de Henoch-Schönlein é reavaliado 10 dias depois, objetivando-se evolução atípica por agravamento do exantema com extensão das lesões ao abdómen e membros superiores. Serologia para vírus negativa, anticorpos IgG e IgM anti *Mycoplasma pneumoniae* positivos. Neste contexto é medicado com azitromicina e prednisolona. Realiza biópsia cutânea, que revela infiltrado linfocitário perivascular com estudo de imunofluorescência direta negativo. Considera-se como hipótese diagnóstica exantema purpúrico a *Mycoplasma pneumoniae*, com melhoria clínica progressiva e resolução completa das lesões em 6 meses.

Comentários / Conclusões

As manifestações dermatológicas são forma de apresentação menos comum da infeção a *Mycoplasma pneumoniae*, tratando-se de um diagnóstico desafiante. Em casos selecionados poderá estar indicada a imunomodulação através da corticoterapia e a antibioterapia adequada, apresentando um bom prognóstico.

Palavras-chave : Purpúrico; Cutânea; Imunomodulação