Neurologia | Caso Clínico

EP-303 - (1JDP-10090) - UMA CAUSA RARA DE AVC HEMORRÁGICO

Beatriz Brazão Câmara[1]; Carolina Ferreira Gonçalves[1]; Lucília Aveiro[1]; Leonor Castro[1]; Edite Costa[1]; Pedro Lima[1]; Paulo Rego Sousa[1]

1 - Hospital Central do Funchal

Introdução / Descrição do Caso

Os AVCs hemorrágicos correspondem a metade dos AVCs em idade pediátrica, sendo a causa mais comum a ruptura de malformações vasculares. Os cavernomas são dilatações sinusoidais, angiograficamente ocultas, com prevalência de 0.4%–0.6%. As cefaleias são o sintoma mais comum. A abordagem inclui um diagnóstico imagiológico precoce, controlo da pressão intracraniana, correcção de factores de risco hematológicos e intervenção cirúrgica em casos refratários.

Adolescente 14 anos, sexo masculino, saudável, com quadro de cefaleia frontal pulsátil (intensidade 10/10) após despertar, associada a vómitos, parestesias, foto e sonofobia. Sem alterações ao exame objectivo. A TC-CE evidenciou lesão hemática fronto-parieto-temporal direita, com Angio-TC e angiografia sem alterações. Durante a permanência na UCINP, com medidas anti-edematosas, manteve elevação da pressão intracraniana (PIC) com apneia, bradicardia e HTA, com necessidade de entubação e monitorização invasiva da PIC. A reavaliação imagiológica revelou agravamento do efeito de massa, que motivou intervenção neurocirúrgica, com diagnóstico intraoperatório de cavernoma superficial temporal, que foi excisado. Após transferência para a enfermaria verificou-se agravamento neurológico, com suspeita de AVC isquémico não confirmada por RM-CE. O estudo de causas de HTA secundária e de coagulopatias não revelou alterações. O restante internamento decorreu sem intercorrências. À data da alta apresentava força grau 4 no membro superior esquerdo, mantendo seguimento multidisciplinar.

Comentários / Conclusões

Os AVCs hemorrágicos são uma causa importante de morbimortalidade em idade pediátrica. Com o presente caso clínico fica patente a necessidade de reconhecimento precoce dos sinais de alarme associados a cefaleia.

Palavras-chave : AVC hemorrágico, Cavernoma, Cefaleia, Sinais de alarme