Cirurgia Pediátrica | Caso Clínico

EP-030 - (1JDP-10110) - DOR ABDOMINAL NUMA CRIANÇA OBSTIPADA – O MESMO PROBLEMA DE SEMPRE?

Sara Almeida¹; Sara Oliveira¹; Sílvia Batalha¹; Joana Rios¹; Alexandre Ferreira²; João Goulão³; Paulo Oom¹

1 - Serviço de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal; 2 - Serviço de Gastroenterologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal; 3 - Serviço de Cirurgia Pediátrica, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal

Introdução / Descrição do Caso

Introdução

A dor abdominal numa criança obstipada é causada na maioria das vezes por um agravamento da mesma. No entanto, não devemos esquecer potenciais diagnósticos diferenciais.

Descrição do caso

Menina de 9 anos de idade, com antecedentes de alopecia, anemia ferropénica e obstipação, é trazida ao serviço de urgência por dor abdominal tipo cólica e anorexia, associadas a episódios de vômitos e obstipação com 3 dias de evolução, sem febre. Ao exame objetivo tinha aspeto emagrecido, palidez da pele e mucosas e no abdómen palpou-se uma massa dura, indolor, ao nível da região epigástrica. As análises revelaram anemia ferropénica, LDH (411 UI/L) e PCR (3.32 mg/dL) elevadas. A ecografia abdominal mostrou ascite perihepática e aerocolia. Foi realizada desimpactação fecal mas, por ausência de resposta, realizou TC abdominal que mostrou a presença de uma invaginação ileoileal e uma volumosa massa endoluminal e heterogénea no estômago. A endoscopia digestiva alta permitiu identificar um tricobezoar, cuja remoção foi apenas possível por gastrostomia. Intraoperatoriamente identificou-se ainda um pequeno bezoar a nível jejunal, a condicionar invaginação, que determinou resseção e anastomose topo-a-topo. Em internamento iniciou acompanhamento psicológico por quadro de ansiedade e humor depressivo decorrentes de situação social grave.

Comentários / Conclusões

Conclusão

Os tricobezoes são pouco frequentes e são habitualmente diagnosticados em doentes que realizam exames por outras suspeitas diagnósticas. Tal como na maioria dos casos, este era consequência de um distúrbio psiquiátrico que foi prontamente identificado e tratado de forma a evitar episódios futuros semelhantes.

Palavras-chave : tricobezoar, obstipação, dor abdominal