

## Hematologia e Oncologia | Caso Clínico

### EP-125 - (1JDP-10120) - MASSA EXOFÍTICA NO INTROITO VAGINAL DE UMA LACTENTE

Sofia Baptista<sup>1</sup>; Ana Cristina Fernandes<sup>1</sup>; Inês Coelho<sup>1</sup>; Teresa Monteiro<sup>1</sup>; Rita Justo Pereira<sup>1</sup>; Daniel Tiago<sup>1</sup>; Filipa Dias<sup>1</sup>; Maria João Virtuoso<sup>1</sup>

1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Hospital de Faro

#### **Introdução / Descrição do Caso**

O diagnóstico diferencial de massas vulvares na infância é extenso e apesar de raras, as neoplasias do aparelho urogenital devem ser consideradas. Os tumores da bexiga são raros em pediatria, sendo o mais comum o rabdomyosarcoma.

Os autores apresentam uma lactente de 10 meses do sexo feminino, previamente saudável, apenas com antecedente de pielonefrite aguda a E.coli multissensível aos 6 meses de idade.

Aos 8 meses é trazida à urgência por aparecimento de massa no introito vaginal e sangue na fralda, com débito urinário aparentemente mantido. À observação tinha excelente estado geral. Identificou-se lesão exofítica homogénea no introito vaginal, vermelha-violácea, elástica, friável, não aderente aos tecidos adjacentes, medindo 2cm de diâmetro. Apresentava ainda candidíase do períneo.

O exame sumário de urina apresentava hematuria, leucocitúria e nitritúria. A urocultura foi negativa e a avaliação analítica não mostrou alterações.

A ecografia pélvica revelou extensa lesão proliferativa que se estendia do colo da bexiga até ao introito vaginal. A ressonância magnética confirmou lesão expansiva intravesical com 7cm de eixo longitudinal, protrusão do colo vesical /uretra, vagina e canal anal pelo pavimento pélvico e envolvimento uretral esquerdo, condicionando uretero-hidronefrose esquerda. Identificaram-se múltiplos gânglios inguinais bilaterais. Restantes exames sem evidência de doença metastática. O estudo anatomopatológico da biópsia revelou um rabdomyosarcoma embrionário da bexiga.

#### **Comentários / Conclusões**

O rabdomyosarcoma da bexiga é um tumor altamente maligno, manifestando-se predominantemente por doença localizada. A presença de uma massa vulvar deve levar à pesquisa desta etiologia, pois um diagnóstico precoce tem implicações prognósticas.

**Palavras-chave : massa vulvar, tumor da bexiga, rabdomyosarcoma, rabdomyosarcoma embrionário da bexiga**