

Urgência | Caso Clínico

EP-443 - (1JDP-10229) - VÔMITOS ASSOCIADOS A CÓLICA ABDOMINAL NA ADOLESCÊNCIA

Patrícia Gomes Pereira¹; Maria Miguel Resende¹; Catarina Pâmela Fernandes²; Inês Sobreira¹; Filipa Rodrigues¹; Maria Manuel Flores¹

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro, Portugal; 2 - Serviço de Cirurgia, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro, Portugal

Introdução / Descrição do Caso

O recurso ao Serviço de Urgência (SU) por vômitos associados a cólica abdominal é frequente em idade pediátrica, e na adolescência a gastroenterite aguda é um dos diagnósticos mais comuns. Apresentamos duas adolescentes, sexo feminino, 12 anos, que recorreram ao SU por vômitos e cólica abdominal, com trânsito intestinal mantido. No 1º caso destacava-se apendicectomia 6 meses antes da admissão. A avaliação do abdómen evidenciou ruídos hidroaéreos (HA) aumentados e dor generalizada à palpação, sem sinais de irritação peritoneal (SIP). Ecografia abdominal, hemograma, enzimas pancreáticas, ALT e AST sem alterações. Durante a vigilância, manteve vômitos e agravamento da dor, pelo que realizou radiografia (RX) abdominal onde se observaram níveis HA e ansa sentinela. Foi colocada a hipótese de brida intestinal, que não resolveu com tratamento conservador, realizando-se laparoscopia exploradora que confirmou o diagnóstico e permitiu a resolução do quadro. No 2º caso, a adolescente padecia de obstipação crónica e à observação mantinha posição antálgica, abdómen distendido, timpanizado, ruídos HA aumentados e dor à palpação dos quadrantes esquerdos, sem SIP. O estudo sérico e ecografia abdominal não revelaram alterações. A realização do RX abdominal, por agravamento da dor, evidenciou distensão gástrica que condicionava compressão das ansas intestinais e marcada distensão cólica. Foi colocada SNG e realizados enemas, com normalização da gastroparésia e da obstipação.

Comentários / Conclusões

Este trabalho pretende alertar para os diagnósticos diferenciais da dor abdominal no adolescente, em que uma história clínica meticulosa e a realização de exames imagiológicos adequados permitirão compreender melhor a apresentação clínica e ajustar a terapêutica a cada caso.

Palavras-chave : Vômitos, Cólica abdominal, Adolescência, Gastroparésia, Obstipação, Brida intestinal