

Pediatria Ambulatória | Caso Clínico

EP-343 - (1JDP-9803) - MIÍASE FURUNCULAR EM PACIENTE DE 14 ANOS

Ana Beatriz Franco Arena¹; Glaucia Evelin De Jesus Silva¹; Heloísa Beraldi Murayama¹; Maria Júlia Kapp Bressan¹; Thiago Rampo¹; Ana Luiza Yaekashi Grillo¹; Mariana Gabriela Apolinário Mian¹

1 - Centro Universitário Claretiano

Introdução / Descrição do Caso

A miíase é uma dermatose comum em países tropicais, frequentes em áreas rurais, devido ao fato de o homem estar em contato com o animal por mais tempo e frequência. Na maioria das vezes, a região da pele onde a larva penetra e cresce por um período em torno de 30 a 60 dias (até sua completa maturidade) assume um aspecto inflamatório semelhante a um "furúnculo" - e é por isso que é conhecida como miíase furunculoide. Na América do Sul, os agentes etiológicos mais comuns da miíase humana são as larvas denominadas *C. hominivorax* e *Dermatobia hominis* (Wiedemann, 1819), ambas causadoras das dermatobioses. O principal tratamento para a cura é baseado na remoção mecânica das larvas e no uso oral de ivermectina, um vermífico adequado para este caso.

Comentários / Conclusões

Paciente de 14 anos do sexo feminino, residente da zona urbana da cidade de Rio Claro - SP, passou por três atendimentos no pronto socorro e constantes tratamentos com antibióticos, sem melhora, apresentava abscesso na coxa esquerda, sendo submetida a cirurgia na qual foi encontrada presença de miíase furunculoide *Dermatobia hominis*. Foi realizado o procedimento de retirada manual da larva.

Palavras-chave : zoodermose, *Dermatobium Hominis*, myiasis