

EP-036 - (1JDP-9911) - BRIDA CONGÉNITA EM ADOLESCENTE – UM CASO RARO DE OCLUSÃO INTESTINAL

Bárbara Barroso De Matos¹; Nélia Santos Gaspar¹; Débora Aroeira¹; Sara Ferreira¹; Ema Santos²; Maria Knoblich²; Julieta Morais¹

1 - Serviço de Pediatria - Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.; 2 - Serviço de Cirurgia Pediátrica – Hospital de Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E.

Introdução / Descrição do Caso

As oclusões intestinais em idade pediátrica resultam maioritariamente de bridas pós-operatórias ou inflamatórias. As bridas que não têm relação com processos intra-abdominais prévios designam-se bridas congénitas e representam apenas 0,7-2% das causas de oclusão intestinal, sendo extremamente raras em adolescentes e adultos.

Rapariga de 17 anos, sem antecedentes cirúrgicos, recorreu ao Serviço de Urgência por dor abdominal moderada tipo cólica no hipocôndrio esquerdo e quadrantes inferiores associada a vômitos alimentares com um dia de evolução. Analiticamente com leucocitose, neutrofilia e hipocaliémia; ecografia abdominal sem alterações. Foi internada para vigilância clínica, analgesia endovenosa e correção hidroeletrólítica. Em D4 de internamento, por agravamento da dor, distensão abdominal, diminuição dos ruídos hidro-aéreos, vômitos biliosos e ausência de emissão de fezes, realizou radiografia de abdómen que revelou níveis hidro-aéreos. A ecografia abdominal identificou sinais de obstrução intestinal alta, pelo que foi submetida a laparotomia exploradora, que revelou brida congénita entre o grande epíplon e o íleon terminal, condicionando torção de segmento jejunal, sem isquémia, e perfuração focal do íleon. Realizou-se destorção jejunal, lise da brida, ressecção segmentar ileal e anastomose ileo-ileal. Pós-operatório decorreu sem complicações tendo alta ao 7º dia.

Comentários / Conclusões

A etiologia exata das bridas congénitas permanece desconhecida. É mais frequente entre os 2 dias e os 7 anos, podendo, porém, surgir em qualquer idade. Apesar de raro, este caso alerta para a possibilidade da existência de bridas congénitas num doente com sintomas de oclusão intestinal. Apenas a cirurgia exploradora tem carácter diagnóstico e curativo.

Palavras-chave : Brida Congénita, Oclusão Intestinal, Idade Pediátrica