Infecciologia | Caso Clínico

EP-192 - (1JDP-9951) - INFECÇÃO POR STREPTOCOCCUS PYOGENES - UMA APRESENTAÇÃO DIFERENTE

Catarina Schrempp Esteves[1]; Carlota Veiga De Macedo[1]; Miguel Paiva Pereira[1]; João Brissos[1]; Ana Serrão Neto[1]

1 - Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas

Introdução / Descrição do Caso

A dermatite perianal por Streptococcus pyogenes tem uma apresentação clínica típica, mas é amplamente subdiagnosticada e, consequentemente, implica investigações diagnósticas desnecessárias, atraso no diagnóstico e tratamento. Caracteriza-se por um eritema vermelho vivo bem demarcado 2-4 cm em redor do ânus, com distribuição centrífuga. Pode associar-se a fissuras, hematoquézias, prurido perianal e dor à defecação. Afecta mais crianças do sexo masculino, entre os 6 meses e 10 anos. Raramente, existe doença sistémica com febre. Poderá haver história familiar de faringite por este agente.

Criança do sexo masculino de 22 meses, sem antecedentes, com quadro clínico de rinorreia anterior, prostração, recusa alimentar e um vómito alimentar com 48h de evolução. Sem febre, odinofagia, diarreia, obstipação ou alterações urinárias. Durante a estadia no hospital, noção de desconforto na mudança de fralda. Ao exame objetivo, apresentava-se prostrado, obstrução nasal, orofaringe hiperemiada e eritema perianal bem delimitado, cerca de 2 cm largura. Restante exame normal. Contexto epidemiológico de pai com amigdalite bacteriana. Analiticamente, apresentava leucocitose com neutrofilia relativa, PCR 1.6 mg/dL. Teste diagnóstico antigénico rápido da orofaringe negativo e perianal positivo. Urina II sem alterações. Alta com indicação para realizar antibioterapia com amoxicilina oral e mupirocina tópica, durante 10 dias. Após alta, manteve-se assintomático e sem recorrência do quadro.

Comentários / Conclusões

Antibioterapia sistémica é fundamental para a resolução clínica. A suspeita clínica pelas características da dermatite e o tratamento precoce diminuem a morbilidade. O tratamento consiste em amoxicilina oral durante 10 dias associada a terapêutica tópica.

Palavras-chave : Streptococcus pyogenes, dermatite perianal