

Medicina do Adolescente | Caso Clínico

EP-240 - (1JDP-9973) - SÍNDROME DE HERLYN-WERNER-WUNDERLICH – UMA ETIOLOGIA RARA DE DOR ABDOMINAL –

Jacinta Mendes¹; Catarina Soares²; Mariana Pedro¹; Nuno Vilas Boas¹; Vera Oliveira²; Anabela Bicho¹

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha; 2 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha

Introdução / Descrição do Caso

A síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich é uma variante rara das anomalias congénitas dos ductos müllerianos. Caracteriza-se pela tríade útero didelfo, septo vaginal e agenesia renal. As manifestações clínicas ocorrem geralmente após a menarca.

Adolescente de 12 anos, com antecedentes de agenesia renal direita, que recorreu a um Serviço de Urgência Pediátrico por dismenorrea de agravamento progressivo nos seis meses subsequentes à menarca. Ao exame objetivo apresentava massa palpável na fossa ilíaca direita sem outras alterações. Foi realizada investigação complementar abdomino-pélvica com ecografia e tomografia computadorizada que permitiu corroborar a agenesia renal direita e identificar a existência de hematometria, hematocolpos, útero didelfo e septo vaginal obstrutivo do colo uterino direito. Foi estabelecido o diagnóstico de síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich e programada no Serviço de Ginecologia a abordagem cirúrgica com abertura do septo vaginal e drenagem do hematocolpos. A adolescente manteve seguimento apresentando resolução completa das manifestações clínicas.

Comentários / Conclusões

As anomalias congénitas do sistema génito-urinário são causas raras de dor abdominal na adolescência. Na síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich a existência de uma hemivagina funcional permite um fluxo menstrual regular paralelamente à formação do hematocolpos. O atraso no diagnóstico apresenta elevado risco de complicações como piohematocolpos, doença inflamatória pélvica, endometriose ou infertilidade. Um elevado índice de suspeição é fundamental para o diagnóstico e tratamento oportunos, controlo sintomático precoce e prevenção de complicações a curto e a longo prazo.

Palavras-chave : Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich, útero didelfo, agenesia renal, hematocolpos, ductos müllerianos