

EP-207 - (1JDP-9982) - GIARDÍASE E HIPOALBUMINÉMIA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Ana Isabel Foles¹; Anaísa Afonso¹; Diana Silva¹; Estela Veiga¹

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.

Introdução / Descrição do Caso

Na maioria dos casos, a infeção por *Giardia intestinalis* (GI) é assintomática. Contudo, quando tal não acontece, a forma de manifestação mais comum é giardíase crónica. Esta permanece uma causa importante de morbilidade pediátrica em países em desenvolvimento. Em Portugal, a prevalência de GI sintomática é inferior a 4%.

Apresentamos o caso de uma criança de 4 anos, previamente saudável. Residente em meio urbano com saneamento adequado, conviventes assintomáticos, sem frequência de infantário, contacto com animais ou viagens recentes. Recorre ao Serviço de Urgência em D4 doença por febre, vómitos alimentares e diarreia aquosa (sem sangue/ muco), com desidratação moderada. Entre D6-D11, ocorreu agravamento substancial do quadro, com mais de 20 dejeções diarreicas diárias, perda ponderal de 14%, e início de edema periorbitário bilateral e dos membros inferiores. Quando novamente questionada, a criança revela ingestão de fruta não lavada. Analiticamente destacava-se elevação dos parâmetros inflamatórios, hipoalbuminémia (1.7g/dL), hipoproteinémia (4.1g/dL) e hiponatremia (131mmol/L). Excluiu-se proteinúria e patologia hepática como causa do edema. Foram realizados exames bacteriológicos e pesquisa de antígenos nas fezes, positivos para antígeno GI em 2 amostras. O doente foi medicado com Albendazol 5 dias, com rápida e total recuperação clínica.

Comentários / Conclusões

A instalação de diarreia aguda exuberante associada a enteropatia perdedora de proteínas constitui uma apresentação incomum de giardíase em crianças imunocompetentes. Com este trabalho pretendemos alertar para a importância da investigação epidemiológica extensa, do reconhecimento e tratamento de infeção por GI, permitindo rápida recuperação clínica e controlo de possível foco epidemiológico.

Palavras-chave : *Giardia intestinalis*, diarreia, hipoalbuminémia