

EP-132 - (1JDP-9983) - TUMOR MUCINOSO BORDERLINE DO OVÁRIO, UM TUMOR RARO EM IDADE PEDIÁTRICA

Mariana Oliveira Pereira¹; Lídia Leite¹; Vasco Carvalho¹; Teresa Pontes¹; Augusta Gonçalves¹; Filipa Almeida Leite²; Helena Silva¹

1 - Hospital de Braga; 2 - Instituto Português de Oncologia do Porto

Introdução / Descrição do Caso

Os tumores do ovário são raros em Pediatria, sendo malignos em 1-1.5% dos casos. Os tumores *borderline* são definidos, histologicamente, por proliferação epitelial atípica, sem invasão do estroma. Representam 10-15% dos tumores ováricos, sendo a maioria serosos ou mucinosos.

Descrição do caso: Adolescente de 16 anos, com antecedentes de duplicação pielocalicial, menarca aos 15 anos, ciclos regulares, recorreu ao Serviço de Urgência por tumefação abdominal com 2 meses de evolução, associada a dor abdominal, náuseas, edema dos membros inferiores e aumento ponderal. Tomografia computadorizada (TC) abdomino-pélvica com “exuberante lesão a ocupar o hipogastro, epigastro, região umbilical e hipocôndrio esquerdo e direito, com sede no anexo direito”. Marcadores tumorais negativos. A ressonância magnética confirmou “volumosa massa quística complexa anexial direita, com 23x26.8cm, com compressão do ureter direito e veia cava inferior”. TC torácica sem lesões suspeitas. Transferida para o Instituto Português de Oncologia do Porto. Submetida a salpingo-ooforectomia direita e exérese tumoral que revelou tumor mucinoso *borderline* do ovário direito (estadio IA). Sem necessidade de tratamentos complementares, sob vigilância clínica e imagiológica.

Comentários / Conclusões

Embora a maioria das massas ováricas em Pediatria sejam benignas, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações, melhorar o prognóstico de lesões *borderline*/ malignas e preservar a fertilidade.

Os tumores *borderline* têm, habitualmente, um prognóstico favorável, que depende do estadio e características histológicas. Necessitam de um seguimento a longo prazo, dado o risco de recorrência e eventual transformação maligna.

Palavras-chave : Tumor mucinoso borderline do ovário, Tumefação abdominal