

PD-017 - (20SPP-9375) - PROVAS DE PROVOCAÇÃO ORAL EM PEDIATRIA, UMA CASUÍSTICA DE 5 ANOS

Cátia Granja¹; Margarida Vicente-Ferreira^{1,2}; Filipa Inês Cunha¹; Agostinho Fernandes¹

1 - Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Portugal; 2 - Centro Materno Pediátrico, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal

Introdução e Objectivos

As doenças alérgicas constituem um problema cada vez mais prevalente a nível mundial. Embora a suspeita de alergia medicamentosa seja frequente a sua confirmação é rara, assim como a alergia alimentar muitas vezes é apenas uma manifestação de imaturidade, sendo transitória. Só a prova de provocação oral (PPO) nos permite ter um diagnóstico correcto.

Caracterizar as PPO realizadas a crianças num hospital de nível II.

Metodologia

Análise retrospectiva dos processos clínicos de crianças com idade inferior a 18 anos que realizaram PPO a fármacos ou alimentos entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2018.

Resultados

A amostra incluiu 159 crianças, com média de idades $5,74 \pm 4,84$ anos. A maioria (73%) foi referenciada a partir do serviço de urgência, 76,7% com suspeita de alérgica medicamentosa. Apenas 11,3% das crianças tinham história pessoal de atopia. A maioria (77%) apresentava apenas manifestações mucocutâneas e 15% mais de duas manifestações em simultâneo. Em 19,5% ocorreram reações imediatas, a maioria a alimentos. A IgE específica foi avaliada em 62 (39%) crianças, positiva em 9 e destas, 6 com PPO positiva, mas nenhuma a medicamentos. Das 21 PPO positivas (13,2%), 9 (42,9%) foram a medicamentos e 12 (51,1%) a alimentos.

Conclusões

A confirmação de alergia medicamentosa ou alimentar foi fundamental na orientação posterior destas crianças, tendo em conta a elevada percentagem de falsas alergias, nomeadamente a medicamentos. Tendo em conta a repercussão em decisões terapêuticas posteriores, os autores consideram importante a referenciação destas crianças para esclarecimento diagnóstico, sendo a PPO o *gold standard* na confirmação ou exclusão destas situações.

Palavras-chave : Prova de Provocação Oral, Crianças, Alergia, Alimentos, Medicamentos