Pneumologia | Caso Clínico

PD-015 - (20SPP-9455) - TOSSE CONVULSA: A IMPORTÂNCIA DA SUSPEITA DIAGNÓSTICA

Ana Luísa De Carvalho¹; Sílvia Coelho Mota¹; Maria Miguel Gomes^{1,2}; Augusta Gonçalves¹; Carla Moreira¹

1 - Serviço de Pediatria do Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho

Introdução / Descrição do Caso

Introdução: A tosse é um motivo frequente de recurso à urgência, sendo na maioria dos casos benigna, auto-limitada e de etiologia vírica.

Descrição do caso: 12 anos, género masculino, antecedentes de asma e rinoconjuntivite, medicado diariamente com furoato de fluticasona+vilanterol e montelukaste. Recorreu à urgência por acesso de tosse súbito e muito intenso associado a dispneia, tremores e hipersudorese. Referia quadro de tosse irritativa, não cianosante/ruborizante/emetizante com 1 semana de evolução. Apirético. Sem outros sintomas. Avaliado no Centro de Saúde no dia anterior e medicado com carbocisteína, prednisolona e claritromicina. Exame objetivo com murmúrio vesicular diminuído, mas sem hipoxemia nem sinais de dificuldade respiratória. Alta sob broncodilatador, ajuste de corticoterapia e mantendo claritromicina. Recorreu novamente à urgência em D12 de doença por persistência da tosse. A radiografia de tórax mostrou infiltrado bilateral, tendo sido alterado antibiótico para azitromicina. Avaliado em consulta em D16, tendo sido descritos episódios de tosse cianozante com uivo. Pesquisa positiva de Bordetella pertussis nas secreções respiratórias. Manteve tosse, por vezes emetizante, até D45 tendo recorrido mais 2 vezes ao Serviço de Urgência.

Comentários / Conclusões

Conclusão: Os autores apresentam este caso, de modo a alertar para o diagnóstico de tosse convulsa, uma das etiologias menos frequentes de tosse. De realçar, que os paroxismos de tosse e uivo inspiratório nem sempre são presenciados pelo médico e que o exame objetivo habitualmente não apresenta alterações, o que pode conduzir a um atraso diagnóstico e à necessidade de um elevado índice de suspeição.

Palavras-chave : tosse, tosse convulsa, Bordetella