## Gastrenterologia, Nutrição e Hepatologia | Caso Clínico

## PD-307 - (20SPP-9475) - DOENÇA DE CROHN - UMA APRESENTAÇÃO POUCO COMUM

Nelia Gaspar<sup>1</sup>; Ana Bárbara Matos<sup>1</sup>; Marlene Salvador<sup>1</sup>; Carla Suzana Maia<sup>2</sup>; Ricardo Ferreira<sup>2</sup>; Aníbal Sousa<sup>1</sup>

1 - Centro Hospitalar Médio Tejo; 2 - Centro Hospitalar de Coimbra E.P.E (Hospital Pediátrico)

## Introdução / Descrição do Caso

Descreve-se o caso de um adolescente de 12 anos, observado em consulta de Pediatria por perda ponderal ligeira (<5% em 6 meses) e anorexia, associados a um episódio de retorragia e um episódio de aftas orais. Ao exame objetivo a destacar apenas palidez cutâneo-mucosa e uma marisca na região perineal. Exames complementares revelaram hemoglobina 10,7g/dL [normal (N) 13-15,5g/dL], volume corpuscular médio 65,3fL (N 80-94fL), hemoglobina corpuscular média 20,6pg (N 25-33pg), plaquetas 495000/uL (N 150000-400000/uL), velocidade de sedimentação 97mm/h (N 0-10mm/h), IgA <0,07g/L (N 0,82-4,53 g/L) e anticorpos anti-nucleares positivos. Por ausência de subida da hemoglobina após terapêutica com ferro oral, realizou exames adicionais: calprotectina fecal 1595mg/kg (N <50mg/kg); coproculturas e exame parasitológico das fezes negativos; pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva; ecografia abdominal que evidenciou espessamento parietal do cego e íleon, associado a hiperrefletividade da gordura envolvente, compatível com Doença Inflamatória Intestinal; e endoscopias digestivas alta e baixa, que revelaram colite crónica com atividade severa ao nível do cego e duodenite ligeira. Por suspeita de Doença de Crohn (DC) iniciou tratamento com dieta entérica e azatioprina, encontrando-se clinicamente assintomático oito semanas após início do mesmo.

## Comentários / Conclusões

Os sintomas típicos da DC incluem diarreia crónica, dor abdominal e perda ponderal, sendo as aftas orais uma forma de apresentação, embora pouco frequente. O presente caso alerta-nos para a suspeita de DC em idade pediátrica, perante anorexia e perda ponderal, associadas a anemia sideropénica refratária à terapêutica com ferro oral.

Palavras-chave: Anemia, Doença Inflamatória Intestinal