

**PD-020 - (20SPP-9603) - REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE A FÁRMACOS: QUATRO ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UMA CONSULTA DE IMUNOALERGOLOGIA PEDIÁTRICA**

Marcela De Oliveira Pires<sup>1</sup>; Filipa Forjaz Cirurgião<sup>1</sup>; Margarida Valério<sup>1</sup>; Vivian Gonçalves<sup>1</sup>; Maria João Leiria<sup>1</sup>

1 - Serviço de Pediatria do Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

**Introdução e Objectivos**

As reações de hipersensibilidade a fármacos (RHF), suspeitas ou confirmadas, em idade pediátrica têm um impacto significativo na prática clínica, limitam opções terapêuticas e constituem um fator de ansiedade nos pais. Representam um motivo frequente de referência à Consulta de Imunoalergologia Pediátrica (IAP), sendo, contudo, raramente confirmadas. **Objetivo:** caracterizar a população com suspeita de RHF referenciada à Consulta de IAP num hospital de grau II

**Metodologia**

Estudo retrospectivo de doentes referenciados à Consulta de IAP por suspeita de RHF de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Analisaram-se dados demográficos, manifestações clínicas e exames complementares de diagnóstico.

**Resultados**

Observaram-se 101 doentes com suspeita de RHF. A mediana de idades foi de 6 anos e 56 eram do sexo feminino. O número de referências praticamente duplicou do primeiro para o último ano. Setenta e dois e 29 doentes apresentavam antecedentes familiares e pessoais de atopia, respetivamente. As reações foram tardias na maioria dos casos e os sintomas mucocutâneos ocorreram em 87 doentes. Os antibióticos beta-lactâmicos foram os fármacos suspeitos mais implicados (n=84), seguidos dos anti-inflamatórios não esteróides (n=13). Vinte e um abandonaram a consulta e 9 mantêm-se em estudo. Realizaram-se IgE específicas em 28 doentes, testes cutâneos em 8 e provas de provocação oral para diagnóstico em 67. Confirmou-se o diagnóstico em 8 casos.

**Conclusões**

A suspeita de RHF tem sido motivo crescente de referência nos últimos anos, o que motivou o estudo desta população. Assim como descrito na literatura, apenas uma minoria de casos suspeitos se confirmou, no entanto, a referência e investigação diagnóstica é necessária e fundamental para uma correta orientação destes doentes.

**Palavras-chave :** Reações de hipersensibilidade a fármacos, Antibióticos, Anti-inflamatórios não esteróides