

Pediatria Ambulatória | Caso Clínico

PD-223 - (20SPP-9658) - LESÕES CUTÂNEAS HIPERPIGMENTADAS - UM DIAGNÓSTICO ACIDENTAL

Cátia Leitão¹; Isabel Ayres Pereira¹; Joana Tenente¹; Marta Vila Real¹; Ana Oliveira²; Ana Luísa Leite¹

1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE; 2 - Serviço de Dermatologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE

Introdução / Descrição do Caso

As lesões cutâneas hiperpigmentadas são frequentes na idade pediátrica. O seu padrão e evolução podem levar ao diagnóstico de patologia multissistémica.

Lactente de 4 meses, sexo feminino, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo. Observada no serviço de urgência por conjuntivite aguda, sem outras queixas. Ao exame objetivo (EO) constatadas lesões maculares hiperpigmentadas em padrão concordante com linhas de Blaschko sobre o abdómen e membros inferiores (figura 1). Mãe referia presença de lesões vesiculares congénitas com base eritematosa, com evolução para lesões verrucosas e seguidamente hiperpigmentadas. Aos 7 meses, em consulta de Pediatria, apresentava lesões sobreponíveis, com desenvolvimento estaturo-ponderal e psicomotor normal, sem alterações das faneras, dentição ou ósseas; exame neurológico normal. Por suspeita de incontinência pigmentar (IP) enviada para consulta de Dermatologia Pediátrica e Neuropediatria. Efetuado diagnóstico clínico de IP, a aguardar estudo genético. Aos 2 anos, apresenta lesões menos pigmentadas, sem lesões de novo.

Comentários / Conclusões

A IP, genodermatose dominante ligada ao X, é uma entidade rara afetando 1:40 000 a 1:50 000 dos nados vivos. Classicamente, as lesões cutâneas estão presentes ao nascimento ou primeiros meses de vida e evoluem em 4 fases (vesicular, verrucosa, hiperpigmentada e hipopigmentada). Pode associar-se a alterações da dentição, faneras, ósseas, oftalmológicas e neurológicas. Apesar dos critérios diagnósticos incluírem o estudo genético, este é um diagnóstico clínico. Com este caso, pretende-se reforçar a importância do EO completo em cada avaliação da criança, constituindo uma oportunidade para detetar alterações e levar ao diagnóstico atempado de patologias com impacto sistémico.

Palavras-chave : Incontinência pigmentar, lesões cutâneas hiperpigmentadas, linhas de Blaschko

Download : [Figura 1 - Lesões cutâneas hiperpigmentadas- um diagnóstico accidental.pdf](#)