

PD-189 - (20SPP-9715) - CASO CLÍNICO: RETENÇÃO URINÁRIA – UM SINAL DE DISRAFISMO OCULTO

Carolina Germana Silva¹; Mariana Bastos Gomes¹; Ana De Carvalho Vaz¹; Ana Carneiro¹

1 - Unidade Local de Saúde do Alto Minho

Introdução / Descrição do Caso

Introdução: A apresentação clínica do disrafismo oculto é variável e pode englobar alterações cutâneas, ortopédicas e neuro-urológicas.

Descrição do caso: Adolescente de 13 anos, sexo feminino, sem antecedentes patológicos relevantes. Recorreu ao serviço de urgência por febre com 48 horas de evolução, associada a dor abdominal e lombalgia bilateral. Sem outros sinais ou sintomas. Apresentava globo vesical, murphy renal negativo, sem outras alterações. A ecografia renovesical revelou hiperdistensão vesical com esvaziamento incompleto, sem outras alterações. Analiticamente apresentava proteína C reativa de 2.95 mg/dL e leucocitúria pelo que teve alta com suspeita de infeção urinária, medicada e com indicação para ser reavaliada. A urocultura foi negativa. Na reavaliação clínica durante o exame objetivo foi identificada uma tumefação na região glútea esquerda com um hemangioma suprajacente e assimetria das pregas glúteas, que a mãe referiu estarem presentes desde o nascimento. A RMN da coluna lombossagrada revelou um lipoma sagrado com extensão intra e extracanal e medula ancorada em L4-L5. Foi orientada para consulta de Pediatria e Neurocirurgia.

Comentários / Conclusões

Discussão: Este caso clínico alerta-nos para a importância de um exame objetivo completo, com a inspeção da região lombossagrada em todas as idades.

Palavras-chave : retenção urinária; disrafismo oculto