

Farmacologia e Terapêutica | Caso Clínico

PD-048 - (20SPP-9762) - ACNE FULMINANS: UM DIAGNÓSTICO GRAVE DE UMA PATOLOGIA FREQUENTE

Andreia Marinhos¹; Mariana Gomes²; Carolina Germana Silva²; Lycinia Lima²; Ana Catarina Carneiro²; Vera Teixeira³

1 - Hospital Pediátrico de Coimbra-CHUC; 2 - Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) - Serviço de Pediatria; 3 - Unidade Local de Saúde do Alto Minho - Serviço de Dermatologia

Introdução / Descrição do Caso

O acne *fulminans* é uma forma rara e grave, de instalação súbita, predominante no sexo masculino, caracterizada por lesões ulceradas e dolorosas. O mecanismo etiopatogénico ainda não está esclarecido, havendo descrição de casos relacionados com o uso de isotretinoína oral. Apresenta envolvimento sistémico e laboratorialmente elevação dos parâmetros inflamatórios.

O caso clínico descrito apresenta um adolescente de 15 anos, com acne misto com 1 ano e meio de evolução, com agravamento progressivo que deixou de responder a tratamento com minociclina oral associada a clindamicina com peróxido de benzoílo e isotretinoína tópica. Avaliado por Dermatologia, inicia isotretinoína oral. 3 semanas depois apresenta agravamento significativo das lesões, é associado corticoide oral e cuidados locais. Lesões progressivas sem resposta ao tratamento instituído associadas a epigastralgia, sem febre ou artralgias, pelo que recorre ao serviço de urgência. No exame objetivo apresentava múltiplas erosões, úlceras e crostas hemorrágicas no tronco, com sinais de sobreinfecção e laboratorialmente leucocitose com neutrofilia e elevação da proteína C reativa. Suspendeu isotretinoína e iniciou corticoterapia oral, antibioterapia endovenosa e cuidados locais. Por evolução favorável teve alta ao sexto dia de internamento. Reintrodução de isotretinoína em dose baixa, associada a redução progressiva do corticóide oral, após 1 mês da sua suspensão, sem intercorrências, com reepitelização gradual das lesões iniciais.

Comentários / Conclusões

Este caso demonstra a importância de pensar no efeito secundário de um dos tratamentos mais utilizados no controlo do acne. Reconhecendo precocemente o seu desenvolvimento pode ser tratado, evitando assim progressão mais grave desta entidade.

Palavras-chave : Acne, Acne fulminans, Isotretinoína