

**PD-290 - (20SPP-9777) - PHDA – A EXPERIÊNCIA DA CONSULTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM HOSPITAL DE NÍVEL II**

Ivana Cardoso<sup>1</sup>; Flávia Belinha<sup>2</sup>; Karina Valente<sup>3</sup>; Teresa Pinheiro<sup>3</sup>; Joana Monteiro<sup>3</sup>; Virginia Monteiro<sup>3</sup>

1 - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 2 - Hospital Pediátrico de Coimbra; 3 - Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga

**Introdução e Objectivos**

A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é uma disfunção neurobiológica que compromete a capacidade de concentração, controlo motor e impulsividade. O seu impacto é significativo a vários níveis e a abordagem médica é complexa e prolongada no tempo. O objetivo deste estudo é caracterizar a população com PHDA seguida na Consulta de Desenvolvimento (CD) de um hospital de nível II.

**Metodologia**

Estudo retrospectivo de uma amostra da população infantojuvenil com PHDA seguida na CD do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga entre 2009 e 2018. Utilizado SPSS para análise.

Amostra de 399 doentes, 72.2% sexo ♂, avaliada quanto à sinalização à consulta, investigação, idade do diagnóstico e subtipo, antecedentes familiares (AF) relevantes, comorbilidades, tratamento e apoios instituídos.

**Resultados**

A mediana de idade diagnóstica foi 8 anos; a maioria dos doentes foi orientada para a CD através do médico de família (MF) e tinham AF significativos (61%), predominando a disfuncionalidade familiar (34%); o subtipo misto foi mais frequente na população masculina (69%) e a feminina teve 2x a odd da masculina de apresentar subtipo inatento ( $p=0.002$ ; IC 95% 1.311 a 3.264); 74% tinham comorbilidades, sendo a perturbação de desenvolvimento intelectual a mais comum; as alterações comportamentais predominaram na população masculina, do tipo externalizantes; quase a totalidade dos doentes fez tratamento farmacológico com metilfenidato (97%) e o apoio mais frequente foi o escolar (59%), seguido do acompanhamento psicológico (37.2%).

**Conclusões**

Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura. Salienta-se a sensibilidade da comunidade em relação à doença (MF), possibilitando um diagnóstico e tratamento atempados.

**Palavras-chave :** Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), Comorbilidades

