

PD-082 - (20SPP-9788) - COLECISTITE LITIÁSICA INDUZIDA POR TERAPÊUTICA COM CEFTRIAXONA

Ana Sofia Vilardouro^{1,2}; Mafalda Casinhas Santos²; Maria Luís Sacras³; Florbela Cunha²

1 - 1 Serviço de Pediatria, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE; 2 - Serviço de Pediatria, Hospital Vila Franca de Xira; 3 - Serviço de Cirurgia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE

Introdução / Descrição do Caso

Introdução

O uso de ceftriaxona está associado ao aparecimento ecográfico de litíase biliar, geralmente assintomática, que regride após o término da terapêutica. Raramente evolui para colecistite.

Descrição do caso clínico

Rapaz, 5 anos de idade, antecedentes de suspeita de Síndrome de PFAPA (periodic fever, adenopathy, pharyngitis, aphtous stomatitis). Internamento 2 meses antes por febre alta persistente sem foco tendo cumprido sete dias de ceftriaxona com resolução clínica. Efectuou ecografia abdominal, que revelou vesícula biliar sem alterações. Recorreu ao Serviço de Urgência por dor no hipocôndrio direito e vômitos, sem febre. Apresentava-se anictérico e com Murphy vesicular positivo. A ecografia revelou lamas biliares e vários cálculos, o maior com 5mm no ducto cístico/infundíbulo, sem evidência de processo inflamatório. Cumpriu 7 dias de cefotaxima e metronidazol e 3 dias de gentamicina e teve alta com dieta hipolipídica. Foram excluídas outras causas de litíase como anemia hemolítica ou alterações do metabolismo fosfocálcico e lipídico.

Recorrência das queixas após 2 semanas revelando a ecografia sinais de colecistite aguda litiásica tendo cumprido novo ciclo de antibioterapia com regressão clínica. Após 2 semanas assintomático, reaparecimento do quadro que motivou novo internamento e terapêutica. Foi colecistectomizado revelando o exame anatomo-patológico processo inflamatório vesicular crónico, clinicamente por litíase. Mantém-se assintomático 6 semanas após o procedimento.

Comentários / Conclusões

Discussão

As ecografias realizadas e a exclusão de outras causas litiásicas, permitem-nos admitir uma relação causal entre o aparecimento dos cálculos biliares/coleциstite e a terapêutica com ceftriaxona efetuada durante uma semana, dois meses antes.

Palavras-chave : Colecistite, litíase, ceftriaxona